
Examen Final (Optimisation non linéaire)

M1COTA S2 2018/2019

Lundi le 17 Juin 2019, Durée : 1h30mn.

Exercice 1 (6 Pts) Soit f une fonction continûment différentiable sur \mathbb{R}^n et soit $x \in \mathbb{R}^n$. Supposons que $d \in \mathbb{R}^n - \{0\}$ est une direction de descente de f en x et soit $\alpha \in]0, 1[$. Alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que l'inégalité

$$f(x) - f(x + td) \geq -\alpha g(x)^T d$$

soit vraie pour tout $t \in [0, \varepsilon]$.

Solution: La f est continûment différentiable sur \mathbb{R}^n , donc

$$f(x + d) = f(x) + tg(x)^T d + o(t \|d\|) \quad \boxed{2Pts}$$

et

$$f(x) - f(x + d) = -\alpha tg(x)^T d - (1 - \alpha)tg(x)^T d - o(t \|d\|). \quad \boxed{1Pts} \quad (1)$$

Puisque d est une direction de descente de f en x , nous avons

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1 - \alpha)tg(x)^T d}{t} = (1 - \alpha)g(x)^T d < 0. \quad \boxed{2Pts}$$

Donc, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $t \in]0, \varepsilon]$ l'inégalité

$$(1 - \alpha)tg(x)^T d < 0 \quad \boxed{1Pts}$$

est vérifiée, combinée avec (1), on obtient le resultat.

■

Exercice 2 (4 Pts) Soit le problème de minimisation de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x) = x^2 - \frac{x^3}{3}.$$

Supposons qu'on utilise un l'algorithme

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f'(x_k)$$

avec un pas $\alpha = 1/2$ et une condition initiale $x_1 = 1$.

- 1) Montrer que cet algorithme converge vers un minimum local de f .
- 2) Trouver la vitesse de convergence de cet algorithme.

Examen Final (Optimisation non linéaire)

Solution:

- Puisque $f'(x) = 2x - x^2$, l'algorithme précédent peut être écrit comme suit

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f'(x_k) = \frac{1}{2} x_k^2 \quad \boxed{1P^{ts}}$$

Si $x_1 = 1$, on peut écrire

$$x_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^{k-1}-1}, \quad \boxed{1P^{ts}}$$

donc $x_k \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow \infty$. Mais $f'(0) = 0$ et $f''(0) = 2 > 0$, alors $x = 0$ un minimum local stricte pour f . $\boxed{1P^{ts}}$

- Pour la vitesse de convergence quadratique, il suffit de voir que

$$\frac{|x_{k+1} - 0|}{|x_k - 0|^2} = \frac{1}{2}. \quad \boxed{1P^{ts}}$$

■

Exercice 3 (4 Pts) Soit f une fonction quadratique donnée par

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\top Q x + b^\top x.$$

Où Q est une matrice symétrique, définie positive. Soit la méthode de Newton modifiée :

$$\begin{cases} x_{k+1} &= x_k + t_k d_k, \\ d_k &= -Q^{-1}g(x_k), \\ t_k &= \arg \min\{f(x_k + t d_k), t > 0\}. \end{cases}$$

1. Montrer que f possède un minimum strict.
2. Calculer le pas t_k donné par la méthode de Newton modifiée pour trouver le minimum de f .
3. Montrer que cette méthode trouve le minimum de f après une seule itération.

Solution: Puisque f est une fonction quadratique de la forme

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\top Q x + b^\top x.$$

Alors,

$$g(x) = Q x + b$$

et

$$H(x) = Q. \quad \boxed{1P^{ts}}$$

Examen Final

1. Calculons le point critique de g ($g(x^*) = 0$) :

$$g(x^*) = 0 \iff Qx^* + b = 0 \iff x^* = -Q^{-1}b \quad \boxed{1P^{ts}}$$

Puisque Q est définie positive pur tout $x \in \mathbb{R}^n$, alors x^* est un minimum global strict de f .

2. Calculons d'abord la direction d_k :

$$d_k = -Q^{-1}(Qx_k + b) = -x_k - Q^{-1}b. \quad \boxed{1P^{ts}}$$

Maintenant si on utilise la méthode de Newton modifiée :

$$\begin{cases} x_{k+1} &= x_k + t_k d_k, \\ d_k &= -Q^{-1}g(x_k), \\ t_k &= \arg \min\{f(x_k + td_k), t > 0\}. \end{cases}$$

La solution exacte du problème

$$t_k = \arg \min\{f(x_k + td_k), t > 0\}.$$

Est donné par

$$t_k = -\frac{g(x_k)^\top d_k}{d_k^\top Q d_k} \quad \boxed{1P^{ts}}$$

On développant la formule précédente, on s'aperçoit que

$$t_k = -\frac{g(x_k)^\top d_k}{d_k^\top Q d_k} = -\frac{g(x_k)^\top (-Q^{-1}g(x_k))}{(-Q^{-1}g(x_k))^\top Q d_k} = -\frac{g(x_k)^\top d_k}{(-Q^{-1}g(x_k))^\top Q d_k} = -\frac{g(x_k)^\top d_k}{-(g(x_k)^\top Q^{-1}Q d_k)} = 1.$$

Soit $x_0 \in \mathbb{R}^n$ alors

$$x_1 = x_0 + t_0 d_0 = x_0 - 1(x_0 - Q^{-1}b) = x^*. \quad \boxed{1P^{ts}}$$

■

Exercice 4 (6 Pts) Utiliser la méthode de Newton pour minimiser

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \cos x.$$

Le point initial est $x_0 = 0,5$ et le test d'arrêt est $|x_{k+1} - x_k| < \epsilon$, avec $\epsilon = 10^{-5}$.

Solution: Soit

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \cos x.$$

$$g(x) = x + \sin x,$$

$$H(x) = 1 + \cos x. \quad \boxed{1P^{ts}}$$

Examen Final (Optimisation non linéaire)

Donc

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x + \sin x}{1 + \cos x}. \quad \boxed{1P^{ts}}$$

Si $x_0 = 0.5$, alors

$$x_1 = -0.0216417954; g(x_1) = -0.04328190145; H(x_1) = 1.999765826,$$

$$x_2 = 0.00000168950; g(x_2) = 0.0000033790; H(x_2) = 2.0,$$

$$x_3 = 0; g(x_3) = 0.0; H(x_3) = 2.0;$$

$$x_4 = 0; g(x_4) = 0.0; H(x_4) = 2.0; \quad \boxed{2P^{ts}}$$

Notons que $|x_4 - x_3| < 10^{-5}$ et que $g(x_4) = 0$ en plus $f''(x_4) = 2 > 0$ donc $x^* = x_4$ est un minimum local strict. $\boxed{2P^{ts}}$

■